Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:52

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/agil-100ec-1l-p-284.html



AGIL 100EC 1l

Numer MIZAR	**01332**
Kod EAN	**5902077107628**
Producent	**Brak**

Opis produktu

AGIL 100 EC 1l

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych, szkółkach i uprawach leśnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.
Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice.
Chwasty odporne np: wszystkie rośliny dwuliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze, warzywne, sadownicze, leśne.
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:
a) do zwalczania chwastów jednorocznych (chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy i inne) od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia w dawce: 0,6-0,8 l/ha.
b) do zwalczania samosiewów zbóż w dawce: 0,5-0,7 l/ha, w okresie od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia 0,5 l/ha, w okresie od pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło 0,7 l/ha.
c) do zwalczania perzu gdy, rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) w dawce 1,25-1,5 l/ha.
Agil 100 EC do zwalczania perzu można stosować w dawkach dzielonych - 2x0,6 l/ha w odstępie 12 dni.

Rośliny rolnicze:
- zespół uprawek pożniwnych (zwalczanie perzu).
Zabieg wykonuje się po sprzęcie przedplonów, gdy rozłogi perzu pocięte w trakcie uprawy mechanicznej powschodziły i osiągnęły wysokość 15-20 cm. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie miesiąca od zastosowania środka, a siew roślin jednoliściennych (np. zbóż), nie wcześniej niż w 6 tygodni po zabiegu.
- ziemniak.
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi).
- burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Uwagi:
1. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).
2. Do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych Agil 100 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Betanal 160 EC lub Betanal Progress AM 180 EC w dawkach i terminach zgodnych z zaleceniami stosowania tych środków, przestrzegając wszystkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykietach-instrukcjach ich stosowania.
- burak cukrowy, burak pastewny (plantacje nasienne).
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do chwili, gdy pędy nasienne osiągną wysokość 10-15 cm.
- rzepak ozimy.
Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy.
- bobik, groch jadalny na suche nasiona.
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2-3 liści, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.

Rośliny warzywne
- burak ćwikłowy.
Opryskiwać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Nie stosować na rośliny przeznaczone na botwinę.
- bób, groch zielony.
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).
- cebula.
Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych, Plantacje nasienne opryskiwać po

wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm.
- kapusta głowiasta (biała, czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
- marchew, pietruszka.
Opryskiwać od fazy dwóch liści rośliny uprawnej.
- seler.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów.
- pomidor (z rozsady).
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady, np w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
- ogórek.
Opryskiwać po wschodach chwastów, od fazy trzech liści rośliny uprawnej.
Nie stosować dawki wyższej niż 0,8 l/ha.
Środka nie stosować później niż na 14 dni przed pierwszym zbiorem.
- fasola.
Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści.

Rośliny sadownicze
- rośliny jagodowe (agrest, porzeczki, truskawka, malina).
- sady (drzewa owocowe) i szkółki.
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.

Leśnictwo
- szkółki leśne (od wysiewu do 3 lat po wysiewie).
Środek stosować wiosną po wschodach chwastów jednoliściennych
-Zalecana dawka: 0,5-1,5 l/ha.
- uprawy leśne (od posadzenia sadzonek do 4 lat po posadzeniu).
Środek stosować wiosną po wschodach chwastów jednoliściennych.
-Zalecana dawka: 0,5-1,5 l/ha.
Uwaga
W uprawach leśnych do zwalczania szczególnie uciążliwych chwastów takich jak trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios) oraz mietlica pospolita (Agrostis vulgaris), które są w zaawansowanych fazach rozwoju środek można zastosować w dawce 4 do 6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Agil 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża).
2. Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil 100 EC.
3. Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej.
4. Nie stosować środka podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27oC.
5. W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

KARENCJA: (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
cebula &nbs