Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:28

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/agritox-500sl-1l-p-22795.html



Agritox 500SL 1l

Numer MIZAR	**35481**
Kod EAN	**2000000480213**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

Środek Agritox 500 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

MCPA – związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku.

Chwasty odporne: fiołek polny, przytulia czepna, rumian polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima, jęczmień ozimy- zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 3-go kolanka. 1,5 l/ha
jęczmień jary, pszenica jara, owies zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka. 1,2-1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych zaleceń.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5oC,
w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji) nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
dla zwierząt – 14 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.