Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:48

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/chwastox-extra-300sl-10l-srodek-chwastobojczy-p-292.html



CHWASTOX EXTRA 300SL 10l środek chwastobójczy

Cena	**289,99 zł**
Numer MIZAR	**00167**
Kod EAN	**5902004500072**
Producent	**Brak**

Opis produktu

CHWASTOX EXTRA 300SL

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych, zbożach z wsiewką roślin motylkowych, trawach nasiennych, ziemniaku, lnie, sadach drzew ziarnkowych i pestkowych oraz na terenach przeznaczonych pod uprawę użytków zielonych i na eksploatowanych użytkach zielonych.

Zawartość substancji aktywnej:

MCPA: /kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy/ - 300 g w 1 l środka
(związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli sodowo-potasowych.
Zezwolenie MRiRW Nr 13/2003 z dnia 13.06.2003 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-319/2004 z dnia 21.09.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-99/2007 z dnia 29.03.2007 r.
Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, mięta polna, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, mniszek pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, krwawnik pospolity, jaskier rozłogowy, pokrzywa zwyczajna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, chwasty rumianowate.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- jęczmień jary, pszenica jara, owies.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha (owies), 3-3,5 l/ha (jęczmień, pszenica).
Chwastox Extra 300 SL można stosować także w mieszaninie z innym środkiem.
W pszenicy jarej w celu zapobiegania wyleganiu stosować po wykształceniu przez roślinę uprawną piątego liścia w dawce:
Chwastox Extra 300 SL 3-3,5 l/ha + Cycocel 460 SL 1,5 l/ha.
- jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
-Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha.
Uwaga
W jęczmieniu ozimym i życie środek stosować najlepiej jesienią ze względu na fazę rozwojową chwastów.
Można także stosować mieszaniny z innymi środkami:
Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha + Apyros 75 WG 13,3-20 g/ha (tylko w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym, stosować wiosną od początku fazy krzewienia /4-5 liści/ do jej końca).
W pszenicy ozimej w celu zapobiegania wyleganiu stosować w końcu fazy krzewienia w dawce:
Chwastox Extra 300 SL 3-3,5 l/ha + Cycocel 460 SL 3-3,5 l/ha (w odmianach pszenicy skłonnych do wylegania)
lub
Chwastox Extra 300 SL 3-3,5 l/ha + Cycocel 460 SL 2-3 l/ha (w odmianach pszenicy mniej podatnych na wyleganie)
- zboża z wsiewką koniczyny lub lucerny.
Opryskiwać gdy zboże utworzy zwarty łan (ale nie później niż w końcu fazy krzewienia), a rośliny motylkowe mają 1-3 trójlistki.
Stosować dawki środka takie same jak dla zbóż uprawianych w czystym siewie.
Uwaga
Nie stosować środka, jeżeli zboża i chwasty nie tworzą dostatecznie zwartej osłony dla roślin

motylkowych.
- trawy nasienne.
W roku zasiewu - w okresie krzewienia traw
-Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
starsze plantacje - wiosną, po ruszeniu wegetacji
-Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
- len.
Opryskiwać gdy len osiągnie wysokość 6-12 cm i znajduje się w fazie "jodełki".
-Zalecana dawka: 1,3-1,7 l/ha.
Niższe dawki środka (1,3-1,5 l/ha) stosować gdy len ma wysokość 6-8 cm, a gdy plantacja jest silnie zachwaszczona i w temperaturze poniżej 17oC można podnieść dawkę środka do 1,7 l/ha.
Na plantacji lnu silnie zachwaszczonej gatunkami odpornymi na Chwastox Extra 300 SL (rdesty, gwiazdnica pospolita) stosować środek w mieszaninie z następującymi środkami; w dawkach:
Chwastox Extra 300 SL 1 l/ha + Basagran 480 SL 1,5 l/ha.
lub
Chwastox Extra 300 SL 1 l/ha + Basagran 600 SL 1,2 l/ha.
lub
Chwastox Extra 300 SL 1 l/ha + Asulox 400 SL 2,5 l/ha.
lub
Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha + Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha.
Uwagi:
1. Nie stosować środka na mokry len.
2. Optymalna temperatura do wykonania zabiegu 15-20 oC.
- ziemniak.
Opryskiwać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka na świeżo wzruszoną glebę po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola (po uformowaniu redlin o wysokości około 20 cm w kształcie ściętego stożka).
-Zalecana dawka: 4 l/ha.
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Opryskiwać skupiska chwastów w okresie pełnej ich wegetacji (przed zakwitnięciem).
-Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha.
lub stosować mieszaninę ze środkami Glifocyd 360 SL lub Roundup 360 SL
Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Glifocyd 360 SL 5 l/ha.
lub
Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Roundup 360 SL 5 l/ha.
lub z adiuwantem
Chwastox Extra 300 SL 3 l/ha + Olejan 85 EC 1,5 l/ha.
- malina (niszczenie plantacji przeznaczonych do likwidacji, po zbiorze owoców).
Chwastox Extra 300 SL 2 l/ha + Avans 330 SL 5-6 l/ha.
- tereny przeznaczone pod uprawę i zasiew użytków zielonych.
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji roślin
-Zalecana dawka: 3,5-4,5 l/ha.
Uwaga
Mieszankę pastwiskową można wysiać co najmniej w 5 tygodni od opryskiwania.
- użytki zielone.
1. W roku zasiewu użytku zielonego zabieg można wykonać:
a) w fazie krzewienia większości traw
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) w 2 tygodnie po pierwszym koszeniu
-Zalecana dawka: 3,5 l/ha.
2. W następnych latach użytkowania
-Zalecana dawka: 3,5-4,5 l/ha.
lub mieszanina
Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha + Starane 250 SL 0,6-1 l/ha.
a) wiosną po ruszeniu wegetacji roślin,
b) w 2-3 tygodnie po pierwszym pokosie.
W przypadku obniżonej skuteczności środka zastosowanego w pierwszym terminie, zabieg można powtórzyć