Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:23

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/curzate-top-72-5wp-1kg-p-57.html



CURZATE TOP 72,5WP 1kg

Numer MIZAR	**01759**
Kod EAN	**2000000017976**
Producent	**Brak**

Opis produktu

C U R Z A T E M 72,5 WP

Zawartość substancji aktywnej:
mankozeb /kompleks cynku z manebem zawierający 20% manganu i 2,5% cynku/ (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 68%
cymoksanil /2-cyjano-N-[(etyloamino)karbonylo]-2-(metoksyimino)acetamid/ (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 4,5%.

I OPIS DZIAŁANIA

CURZATE M 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka i pomidora przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka i cebuli przed mączniakiem rzekomym.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Rośliny rolnicze
a) ziemniak
zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
– na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
– na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Curzate M 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
2. Rośliny warzywne
a) pomidor (w gruncie)
zaraza ziemniaka
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.
Zalecana dawka: 2,3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
b) pomidor (pod osłonami)
zaraza ziemniaka
Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m2
.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
c) ogórek (w gruncie)
mączniak rzekomy dyniowatych
Zalecane dawki: 2,3 kg/ha
Wysokość dawki dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz nasilenia choroby
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
d) ogórek (pod osłonami)
mączniak rzekomy dyniowatych
Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m2
.
Środek stosować 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym co 7dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
e) cebula
mączniak rzekomy cebuli
Zalecana dawka: 2-2,3 kg/ha
Wysokość dawki dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz nasilenia choroby.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego w danym rejonie.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Należy także zapewnić jak najlepsze pokrycie całych roślin cieczą użytkową stosując np.:

rozpylacze z podwójnymi otworami opryskowymi, systemy podwójnych rozpylaczy, opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza.
UWAGI:
Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

III OKRES KARENCJI
/okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji/
ZIEMNIAK - 11 DNI,
POMIDOR - 4 DNI,
OGÓREK - 3 DNI,
CEBULA - 14 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
/okres zapobiegający zatruciu/
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.