Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:16

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/decis-mega-50ew-1l-p-536.html



DECIS MEGA 50EW 1l

Cena	**235,99 zł**
Numer MIZAR	**07908**
Kod EAN	**5908229369630**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) -50 gw1 litrześrodka (4,80 %).

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy
Mszyca burakowa
Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Pchełka burakowa, drobnica burakowa
Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Śmietka ćwiklanka
Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima, jęczmień jary
Mszyce
Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.

Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Gnatarz rzepakowiec
Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Chowacz brukwiaczek
Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak jary i ozimy
Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa.
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Mszyca kapuściana
Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń
Kwieciak jabłkowiec
Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Mszyca jabłoniowa
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Śliwa
Mszyce
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Porzeczka czarna
Mszyce
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Truskawka
Kwieciak malinowiec
Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY WARZYWNE

Pomidor (w gruncie)
stonka ziemniaczana
Stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta biała głowiasta
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY OZDOBNE

Róża (w gruncie)
Mszyca różano-szczeciowa
Stosować po zauważeniu szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100l wody).

Skoczek różany
Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
1. W ochronie buraka cukrowego zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu. W ochronie rzepaku jarego, zbóż, roślin sadowniczych, roślin warzywniczych i roślin ozdobnych zaleca się wykonanie maksymalnie 2 zabiegów w odstępach 14-21 dni. W ochronie ziemniaka zaleca się wykonanie maksymalnie 2 zabiegów w odstępie 7 dni. W ochronie rzepaku ozimego zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną w odstępie 14-21 dn