Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:21

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/goltix-compact-90wg-150g-p-21320.html



Goltix Compact 90WG 150g

Numer MIZAR	**33986**
Kod EAN	**2000000465876**
Producent	**Brak**

Opis produktu

GOLTIX COMPACT

90 WG 150G

Zawartość substancji aktywnej:
metamitron/ 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on/
(związek z grupy triazyn) – 90%.

I OPIS DZIAŁANIA
Goltix Compact 90 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty odfazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku.

Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.

TRUSKAWKA

Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodai chwastów lub w momencie wschodów chwastów.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Środek można stosować metodą dawek dzielonych łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC:
pierwszy zabieg wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów:
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.

drugi zabieg (najczęściej około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem kwitnienia truskawki):
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.

Nie stosować do odchwaszczania odmiany truskawki Elsanta. Na nowo zarejestrowanych odmianach wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia ich wrażliwości.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

BURAK CUKROWY

1. Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym:

Pierwszy zabieg - Goltix Compact 90 WG 1,5 kg/ha - bezpośrednio przed wschodami chwastów

Drugi zabieg - Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.

Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji siewek chwastów

Trzeci zabieg - Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
Zabieg wykonać w 7-10 dni po drugim zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji kolejnych siewek chwastów.