Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:27

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/mospilan-20sp-20g-p-408.html



MOSPILAN 20SP 20g

Cena	**21,99 zł**
Numer MIZAR	**09662**
Kod EAN	**5901891280661**
Producent	**Brak**

Opis produktu

MOSPILAN 20 SP 20
gram

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze
- ziemniak.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.
Zabieg wykonać w momencie masowego składania jaj i wylęgu larw
- ziemniak (plantacje nasienne).
-mszyce-wektory chorób wirusowych.
-Zalecana dawka: 0,15 kg/ha.
Zabieg wykonać w ciągu tygodnia od pełni wschodów lub po pojawieniu się form uskrzydlonych mszyc.

- burak cukrowy, burak pastewny.
-pchełka burakowa.
-Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.
- mszyca burakowo-trzmielinowa.
- Zalecana dawka: 0,125 l/ha
Stosować przed masowym wystąpieniem kolonii mszyc.

- rzepak ozimy.
-chowacz brukwiaczek (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego).
-Zalecana dawka: 0,12 kg/ha.
Opryskiwać w momencie nalotu na plantację lub w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika. Zabieg wykonywany w drugim terminie niszczy jaja i młode larwy obecne już w roślinie.

- rzepak ozimy, rzepak jary.
-słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
-Zalecana dawka: 0,08-0,12 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku równoczesnego zwalczania słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- tytoń.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się form uskrzydlonych.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rośliny sadownicze
- drzewa owocowe.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
- kwieciaki.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Opryskiwać tuż przed pękaniem paków lub w trakcie pękania pąków. W przypadku zwalczania kwieciaka gruszowca zabieg przeprowadzić pod koniec lub na początku czerwca po pojawieniu się chrząszczy.
- owocnice.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych.
-owocówki.
-Zalecana dawka: 0,125 - 0,2 kg/ha.
Stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka".
-miodówka gruszowa plamista.
-Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Zabieg wykonać wczesną wiosną. Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia. Stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych.
-zwójki liściowe i inne gąsienice zjadające liście.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Opryskiwać w okresie zielonego pąka lub na początku różowego pąka.

- jabłoń.
-toczyk gruszowiaczek.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Zabieg wykonać w fazie różowego pąka pod koniec opadania płatków kwiatowych.

- czereśnia.
-nasionnica trześniówka.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Zabieg wykonać po nalocie szkodnika od momentu składania jaj.

Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

- rośliny jagodowe.
-kwieciak malinowiec.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Opryskiwać w okresie pojawiania się chrząszczy, kiedy pąki w kwiatostanach rozluźniają się. Przy licznym pojawieniu się szkodnika zabieg powtórzyć po 7-10 dniach lub na początku kwitnienia.
- zwójkówki.
-Zalecana dawka: 0,125 - 0,2 kg/ha.
Opryskiwać w okresie wylęgania się larw, zwykle tuż przed kwitnieniem lub po kwitnieniu.

- czarna porzeczka.
-przeziernik porzeczkowiec.
-Zalecana dawka: 0,125 – 0,2 kg/ha
Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli. Wykonać 3 zabiegi w odstępach 10-14 dni. Ostatni zabieg przeprowadzić po zbiorze owoców.
-pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha
Opryskiwać w okresie intensywnego lotu muchówek i składania jaj. Wykonać 3 zabiegi w odstępach 10-14 dni. Ostatni zabieg przeprowadzić po zbiorze owoców w celu zwalczania II pokolenia szkodnika.
- mszyce.
-Zalecana dawka: 0,125 kg/ha
Zabieg wykonać w okresie nalotu szkodników po kwitnieniu porzeczki.

- truskawka
-opuchlaki.
-Zalecana dawka: 0,3 kg/ha
-Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach sadowniczych: 500-900 l/ha.

Rośliny warzywne (w gruncie)
- kapustne.
-wciornastki.
-Zalecana dawka: 0,2-0,3 kg/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

- cebula (z siewu i rozsady).
-wciornastki.
-Zalecana dawka: 0,2-03 kg/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rośliny warzywne (pod osłonami)
- pomidor, ogórek, papryka, oberżyna.
-mączlik szklarniowy.
-Zalecane stężenie: 0,025% (25 g środka w 100 litrach wody).
Opryskiwać bezpośrednio po zauważeniu pierwszych uskrzydlonych owadów.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
W przypadku ponownego wzrostu populacji szkodnika zabieg powtórzyć.

Rośliny ozdobne (w gruncie i po osłonami)
-mączlik szklarniowy, mączlik poinsecjowy.
-Zalecane stężenie: 0,04% (40 g środka w 100 litrach wody).
Opryskiwać bezpośrednio po zauważeniu pierwszych uskrzydlonych owadów
-wciornastki.
-Zalecane stężenie: 0,02%. (20 g środka w 100 litrach wody).
Rośliny opryskiwać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
-wełnowiec cytrusowiec i inne czerwce, mszyce.
-Zalecane stężenie: 0,01-0,02%. (10-20 g środka w 100 litrach wody).
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych owadów.
Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku mszyc odpornych na środki ochrony roślin np. mszycy ogórkowej.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: w gruncie 300-600 l/ha, pod osłonami 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.