Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:59

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/mospilan-20sp-600g-owadobojczy-mszyca-stonka-p-44996.html



Mospilan 20SP 600g owadobójczy mszyca stonka

Numer MIZAR	**29628**
Kod EAN	**2000000418315**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Mospilan 20SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślinach sadowniczych, warzywnych, ozdobnych.Środek MOSPILAN 20 SP stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

Charakterystyka:

SKU: 130744
Producent: Sumi Agro
Substancja aktywna: acetamipryd
Uprawa: Agrest, Bób, Borówka, Brzoskwinia, Burak ćwikłowy, Cebula, Czereśnia, Czosnek, Dynia, Fasola, Groch Jadalny, Grusza, Jabłoń, Kapusta brukselska, Kapusta głowiasta, Kapusta pekińska, Kawon, Leszczyna, Malina, Melon, Morela, Oberżyna, Ogórek, Papryka, Pomidor, Por, Porzeczka biała, Porzeczka czarna, Porzeczka czerwona, Sałata, Śliwa, Szpinak, Truskawka, Winorośl, Wiśnia, Ziemniak
Sposób działania: doliścienne
Rodzaj środka: owadobójcze
Postać preparatu: proszek
Opakowanie: karton
Pojemność: 0,6 kg
Formulacja: SP
EAN: 5903154315967

Uwagi:

1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Mospilan 20 SP zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.