Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:59

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/mustang-306se-0-5l-p-409.html



MUSTANG 306SE 0,5l

Numer MIZAR	**09681**
Kod EAN	**2000000096377**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Preparat chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania woda, stosowany nalistnie. Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż i kukurydzy.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g w 1 litrze środka,
2,4-D EHE (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g w 1 litrze środka w formie kwasu, co odpowiada zawartości 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego.

Główne Zalety:
Szerokiego zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych np. przytulia, rumianowate, chaber bławatek
Wysokiej skuteczności chwastobójczej i oszczędności finansowej - dopasowanie dawek herbicydów do wielkości chwastów
Oszczędność finansowa - zakup dużego opakowania/większej ilości herbicydu na chwasty dwuliścienne w zbożach i kukurydzy
Możliwości mieszania z herbicydami zwalczającymi chwasty jednoliścienne (miotła, wyczyniec, przytulia, rumianowate, ostrożeń, itp.)
Dopasowanie herbicydów w mieszaninie do stanu i rodzaju zachwaszczenia na każdym polu
Długi czas na wykonanie zabiegów - wykorzystując możliwość stosowania niektórych mieszanin zbiornikowych do fazy 2 kolanka zbóż bez zmniejszenia skuteczności chwastobójczej i negatywnych skutków dla zbóż (brak uszkodzeń zarówno widocznych jak i niewidocznych ale obniżających plon).

Działanie:
Mustang 306 SE jest herbicydem układowym /systemicznym/, pobieranym jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformacje i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, czyli podczas cieplej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur /około 5o C/ całkowite zwalczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Preparat najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe na Mustanga 306 SE: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, milek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna.
Chwasty średnio wrażliwe np: babki, bodziszki, fiolek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kurzyślad polny, mniszek pospolity, nawrot polny, powój polny, poziewnik szorstki, przetaczniki, skrzyp polny.
Chwasty odporne np: czyściec polny, dymnica pospolita, krwawnik
pospolity, chwasty jednoliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA

ZBOŻA OZIME
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.

ZBOŻA JARE

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, MIESZANKI ZBOŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM OWSA)
Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KUKURYDZA
Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować:
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować:
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1.W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej
6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
2.W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.
4. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
5. Przed użyciem herbicydu Mustang 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub producentem środka Mustang 306 SE aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy
nie reaguje ujemnie na te herbicydy.
6. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń stosowania wszystkich środków mieszanych.

Mieszaniny zbiornikowe w zbożach:
Preparat Mustang 306 SE może być stosowany również w mieszaninach zbiornikowych do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach. Jeśli występuje tylko miotła zbożowa to najważniejszym kryterium jest jej wielkość. Gdy miotła jest w fazie kilku liści a jej nasilenie przekracza kilkanaście szt/m2 zazwyczaj wybiera się produkt zawierający izoproturon. Gdy miotła jest większa lub występuje równocześnie wyczyniec polny, perz właściwy możemy wybrać inne produkty.
Uwzględniając powyższe problemy w okresie wiosennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych można zastosować jedna z podanych poniżej mieszanin zbiornikowych herbicydu Mustang 306 SE.
Chwasty dwuliścienne (przytulia <10 okółków, rumianowate, chaber bławatek), miotła zbożowa
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + izoproturon
Chwasty dwuliścienne (przytulia >10 okółków, rumianowate, chaber bławatek, jasnoty, przetaczniki) miotła zbożowa
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + izoproturon + Starane* 250 EC 0,2 l/ha
Chwasty dwuliścienne (przytulia <10 okółków, rumianowate, chaber bławatek), miotła zbożowa
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + Apyros 75 WG 13,3-20 g/ha**
Chwasty dwuliścienne + miotła zbożowa, wyczyniec polny
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + Attribut* 70 WG 60 g/ha**
Chwasty dwuliścienne + miotła zbożowa, wyczyniec polny
Mustang 306 SE 0,5-0,6 l/ha + Atlantis* 04 WG 150-300 g/ha + zwilżacz olejowy 1 l/ha**
Chwasty dwuliścienne (przytulia <10 okółków, rumianowate, chaber bławatek), miotła zbożowa, wyczyniec polny, perz właściwy Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Attribut 60g/ha po 2 tygodniach Attribut 40 g/ha
Chwasty dwuliścienne + duże zagrożenie ostrożeniem

Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + Lontrel* 300 SL 0,15-0,2 l/ha
Chwasty dwuliścienne + duże zagrożenie jasnotami, przetacznikami, poziewnikiem szorstkim, przytulia > 10 okółków
Mustang 306 SE 0,5 l/ha +Starane 250 EC 0,1-0,2 l/ha

Mieszaniny zbiornikowe w kukurydzy:
Ponieważ intensyfikacja produkcji rolnej spowodowała w ostatnich latach zmiany w strukturze zachwaszczenia kukurydzy coraz częściej rolnicy zwracają uwagę na obecność na polach i w konsekwencji możliwości zwalczenia chwastów jednoliściennych: chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy sinej i zielonej oraz perzu właściwego.
W takiej sytuacji jest możliwe zastosowanie mieszaniny zbiornikowej herbicydu Mustang 306 SE z herbicydami zwalczającymi w kukurydzy chwasty trawiaste np: Titus* 25 WG, Maister 310 WG.
Uwzględniając powyższe problemy w okr