Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:54

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/plonvit-z-1l-nawoz-dolistny-dla-zboz-p-45360.html



PLONVIT Z 1l nawóz dolistny dla zbóż

Numer MIZAR	**53778**
Kod EAN	**2000000663838**
Producent	**Brak**

Opis produktu

PLONVIT Z 1l nawóz dolistny dla zbóż

PLONVIT ZBOŻA to płynny, wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do dolistnego dokarmiania zbóż oraz plantacji traw nasiennych.

PLONVIT ZBOŻA szybko i skutecznie dostarcza roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadających wymaganiom pokarmowym zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi (Cu), manganu (Mn) i cynku (Zn), na niedobory których rośliny zbożowe są bardzo wrażliwe. Mikroelementy są schelatowane, dzięki czemu w pełni dostępne dla roślin. Nawóz zawiera także magnez oraz azot poprawiający pobieranie i przyswajanie mikroskładników. W nawozie PLONVIT ZBOŻA zastosowano technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny.

STOSOWANIE:

PSZENICA, PSZENŻYTO

jesień: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16) 1,5 l/ha

wiosna:

I: ozime – krzewienie (BBCH 22–29) 1-1,5 l/ha jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29) 1–1,5 l/ha

II: początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51) 1,5–2 l/ha

III: początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65) 1–1,5 l/ha

JĘCZMIEŃ PASZOWY i BROWARNY

jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 1,5 l/ha

wiosna:

I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32) 1-1,5 l/ha

jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32) 1–1,5 l/ha

II: faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45) 1,5–2 l/ha

III: koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75) 1–1,5 l/ha

ŻYTO

jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 1,5 l/ha wiosna:

I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32) l/ha jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32) 1–1,5 l/ha

II: faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51) 1,5–2 l/ha

III: koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 1–1,5 l/ha

OWIES

I: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22) 1–1,5 l/ha

II: początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39) 1,5–2 l/ha

III: koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 1–1,5 l/ha

TRAWY NASIENNE

Stosować w terminach jak dla zbóż 1,5-2 l/ha

Składniki g/l % (m/m)Azot (N) całkowity19515,0azot (N) amidowy (NH2)19515,0Tlenek magnezu (MgO)262,0Trójtlenek siarki (SO3)594,5Bor (B)0,180,014Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA11,70,900Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA10,40,800Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA14,31,100Molibden (Mo)0,0650,005Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA131,000Tytan (Ti)0,260,020Zastosowana w nawozie PLONVIT ZBOŻA technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.