Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:36

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/ridomil-gold-mz-pepit-67-8wg-1kg-p-1760.html



RIDOMIL GOLD MZ PEPIT 67,8WG 1kg

Numer MIZAR	**00751**
Kod EAN	**5901157070715**
Producent	**Brak**

Opis produktu

RIDOMIL GOLD MZ PEPIT 67,8WG 1kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG - środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin przeznaczony do ochrony ziemniaka, tytoniu, roślin warzywnych i zielarskich przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnych: -metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) -4%; - mankozeb (kompleks cynku z polimerycznym etyleno - bis (ditiokarbaminianem) manganawym, zawierający 20% manganu i 2,5% cynku: związek z grupy ditiokarbaminianów) - 64%

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE
ziemniak.

- alternarioza.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.

- zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować do pierwszego zabiegu. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych.
Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie. W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, zabieg środkiem Ridomil Gold MZ 67,8 WG można powtórzyć po 10 dniach od pierwszego opryskiwania.
Uwaga: Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7-10 dniach od ostatniego stosowania środka Ridomil Gold MZ 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.

tytoń
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2-2,5 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku przewidywanego większego nasilenia choroby..
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Środek stosować zapobiegawczo. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, następne co 10-14 dni.
Uwaga: Środka nie stosować w inspektach podczas produkcji rozsady.

ROŚLINY WARZYWNE
pomidor (w gruncie).
- zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, następne co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

ogórek (w gruncie).
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do zagęszczenia roślin.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, tzn. przed wystąpieniem objawów chorobowych na plantacjach, następne co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

cebula (w gruncie).
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zabiegi wykonać zgodnie z sygnalizacją. Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

rośliny kapustne (rozsadniki).
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Opryskiwać rozsadę od fazy 2-3 liści, co 10-14 dni.

szpinak (plantacje nasienne).
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Opryskiwać plantacje co 10-14 dni.

sałata (plantacje nasienne).
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Opryskiwać od okresu zwijania się główek do pełnego ich formowania się, co 10-14 dni.

ROŚLINY ZIELARSKIE
- mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 1,8-2,4 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować na plantacjach o dużej masie zielonej.
Zalecana ilość wody: 800 l/ha.

UWAGI:
1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. W celu przeciwdziałania wystąpienia odpornych ras grzybów chorobotwórczych, warzywa opryskiwać maksymalnie 3 razy w sezonie.
3. Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): ogórek - 3 dni,
pomidor - 7 dni,
ziemniak, cebula - 14 dni,
rośliny zielarskie - 21 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY.