Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:47

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/roundup-transenergy-450sl-5l-p-37.html



ROUNDUP TRANSENERGY 450SL 5l

Numer MIZAR	**03694**
Kod EAN	**2000000037400**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Roundup®TransEnergy 450 SL 5l

I OPIS DZIAŁANIA
Roundup TransEnergy 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaka, cebuli, marchwi, pietruszki, pora (z siewu) oraz terenach nieużytkowanych rolniczo, ugorach i odłogach oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup TransEnergy 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 0,5-1,5 l/ha: chwasty jednoroczne do fazy pierwszej pary liści właściwych.
w dawce 2 - 3 l/ha np: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne włośnica zielona, włośnica sina, żółtlica drobnokwiatowa, życice.
w dawce 3 - 5 l/ha np: bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, krwawnik pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, wyka ptasia.
w 5 l/ha np: bylica pospolita, ostrożeń polny, rdest powojowy, rdest ptasi, wrotycz pospolity.
Chwasty odporne np: skrzyp polny.

III ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. POLA UPRAWNE
Uwaga!
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu. Jeżeli na polu przeważają inne chwasty dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
A Wiosną po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów
kukurydza
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy.
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Niższe z zalecanych dawki dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
ziemniak
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków.
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym siewnikiem (np. Klein) i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.
burak cukrowy
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
Uwagi!
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

2. ROŚLINY WARZYWNE
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)
cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu)
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej
Zalecana dawka: 0,5-1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
Uwagi!
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
C. Przed zbiorem roślin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary
Zalecana dawka: 1,5 - 3,2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
Uwaga!
Niższą z zalecanych dawek stosować tylko w przypadku wykonywania desykacji.
Przeciwwskazania
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
rzepak ozimy

Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka: 1,5- 3,2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
Uwaga!
W celu właściwego zwalczenia chwastów zbiór wykonać po upływie co najmniej 7 dni od zabiegu.
Przeciwwskazanie
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
Uwagi:
1 W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
2 Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
D. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych - zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana dawka: 2-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
E. Tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza
dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.
Stosować dowolną aparaturę naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,16 l środka na 10 litrów wody.
F. Likwidacja ugorów i odłogów.
Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach w celu