Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:52

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/sekator-plus-526-75od-1l-na-chwasty-w-zbozach-p-44889.html



Sekator Plus 526,75OD 1l na chwasty w zbożach

Cena	**212,99 zł**
Numer MIZAR	**61053**
Kod EAN	**5908229376447**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Sekator Plus 526,75OD 1l

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 2,4-D zaliczana jest do grupy O, a substancje czynne jodosulfuron metylosodowy i amidosulfuron do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwu różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty. Substancja czynna - 2,4-D zaliczana jest do grupy regulatorów wzrostu. W roślinie 2,4-D powodują zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenie, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek zawiera także substancje czynne - jodosulfuron metylosodowy i amidosulfuron, które zaliczane są do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.

Zboża ozime, środek stosowany w dawce 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdest powojowaty, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

Zboża jare, środek stosowany w dawce 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, rdest plamisty, rdest powojowaty (rdestówka), samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

Zboża jare, środek stosowany w dawce 0,45 l/ha
Chwasty wrażliwe bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, rdest plamisty, rdest powojowaty (rdestówka), samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny
Chwasty średniowrażliwe dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

DAWKOWANIE:

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin od fazy pierwszego krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 - 0,6 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. suszy, niskiej wilgotności powietrza oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju i występujące w większym nasileniu.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1