Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:30

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/teldor-500sc-0-5l-grzybobojczy-maliny-truskawki-p-372.html



TELDOR 500SC 0,5l grzybobójczy maliny truskawki

Numer MIZAR	**05118**
Kod EAN	**5908229361368**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Preparat nowej generacji do zwalczania szarej pleśni na roślinach ozdobnych. Trwała powłoka preparatu znajdującego się po oprysku na powierzchni rośliny zapobiega porażeniu przez grzyba powodującego szarą pleśń.
Zastosowanie:
Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych i ozdobnych.

Działanie:
Preparat ma specjalnie przygotowaną płynną postać. Trwała, niewidoczna powłoka preparatu znajdującego się po oprysku na powierzchni rośliny zapobiega porażeniu przez grzyba powodującego szarą pleśń.
Środek najlepiej jest stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby lub zapobiegawczo, jeśli pogoda (liczne opady, wilgoć) sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji. Odstępy między zabiegami powinny wynosić 7-10 dni.

Teldor nie jest toksyczny dla ludzi i środowiska naturalnego, w którym ulega szybkiemu rozpadowi.
Środek jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, pszczół i owadów drapieżnych (naturalnych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami roślin).

Dawki:
Uprawa Problem Zalecane stężenie
rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami szara pleśń 0,1% (10 ml na 10 l wody)
truskawka, poziomka szara pleśń 0,15% (15 ml na 10 l wody)
(karencja - 1 dzień)
malina szara pleśń, zamieranie pędów 0,15% (15 ml na 10 l wody)
(karencja - 1 dzień)
kapusta szara pleśń 15 ml w 7 l wody na 100 m2
(karencja - 7 dni)

Termin stosowania:
Truskawki, poziomki, maliny
Ze względu na krótki okres karencji (1 dzień) można stosować środek tuż przed i pomiędzy zbiorami.

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w odstępach co 7-10 dni.

Kapusta (przechowalnictwo)
Zaleca się dodanie środka zwiększającego równomierność pokrycia roślin cieczą użytkową. Wykonać 2-3 zabiegi w siedmiodniowych odstępach. Ostatni zabieg wykonać nie później niż na 3 dni przed zbiorem kapusty.